ข้อแนะนำเกษตรกรรายย่อย

เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF

1. งดซื้อ หรือนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ ถ้ามีสุกรขุนโตพอที่จะขายได้ให้รีบขาย
2. ห้ามรถ และบุคคลภายนอกเข้า-ออกฟาร์ม รวมถึงฉีดยารักษาสุกร เกษตรกรต้องฝึกฉีดยาเอง
3. ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรที่ป่วยหรือตายผิดปกติโดยเด็ดขาด

4. มีระบบฆ่าเชื้อสำหรับบุคคลและพาหนะที่เข้า - ออกฟาร์ม รถขนอาหารสุกร/รถขนสุกร ต้องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วพักไว้ 1-2 ชั่วโมง ก่อนนำเข้าคอกสุกร

ข้อแนะนำเกษตรกรรายย่อย

เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF

5. ห้ามนำเศษอาหารมาเลี้ยงสุกร เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะมีเชื้อจากเศษเนื้อหรือเลือดสุกรปนเปื้อนมาด้วย หากนำมาให้สัตว์กินต้องต้มด้วยอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที

6. ป้องกันสัตว์พาหะ เช่น สุนัข นก หนู ที่อาจคาบเศษเนื้อสุกรป่วย เข้ามากินภายในฟาร์ม หรือแมลงวันก็สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้

ข้อแนะนำเกษตรกรรายย่อย

เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF

7 งดการผสมพันธุ์สุกร ทั้งการใช้พ่อพันธุ์ผสม หรือการผสมเทียม

8 งดซื้อเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกรมาบริโภค ควรรับประทานโปรตีนอื่นแทน เช่น ไข่ ไก่ เป็ด โค แพะ แกะ ปลา และอาหารทะเล

9 สุกรที่จะจำหน่าย ต้องขนย้ายออกมานอกเล้าสุกร เพื่อลดโอกาสในการรับเชื้อ

10 เปลี่ยนรองเท้า ล้างมือก่อนเข้าไปเล้าสุกร

ข้อแนะนำเกษตรกรรายย่อย

เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF

11 ไม่เลี้ยงสุกรปะปนกับหมูป่า เนื่องจากหมูป่าเป็นแหล่งรังโรคระบาดในสุกร

12 มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทำลายเชื้อโรค อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้ง

13 หากพบสุกรป่วย/ตายผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทันที ห้ามชำแหละ/ขาย/บริโภค

ข้อแนะนำร้านขายอาหารสัตว์

เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF

1. ติดตั้งจุดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณรับ-ส่งอาหาร

2. มีถาดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สำหรับจุ่มเท้าก่อนเข้าร้าน

3. ติดตั้งเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ แบบพกพา บนรถขนส่งอาหารสัตว์

4. ดูแลสุขลักษณะของพนักงาน

"ชัยภูมิร่วมใจ ป้องกันภัยจากโรคระบาดในสุกร"

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 044-812234 ต่อ 13, 044-811928 pvlo_cpm@dld.go.th

ข้อแนะนำผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์

เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF

1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแหล่งที่มาของสัตว์ตามกฎหมาย ที่คอกพักสัตว์
2. ตรวจสุขภาพสุกรในคอกพักสัตว์ ก่อนเข้าโรงฆ่า หากพบสุกรที่ป่วยตามนิยามของโรค ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที
3. ตรวจซาก/เนื้อสัตว์ ที่ผ่านการชำแหละแล้ว
4. ไม่นำสัตว์ป่วยตายผิดปกติเข้าโรงฆ่าสัตว์
5. ติดตั้งเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณทางเข้า-ออกโรงฆ่าสัตว์
6. ใช้โซดาไฟ 2% ฆ่าเชื้อในท่อระบายน้ำ
7. หลังการฆ่าสัตว์ นำมีด เขียง อุปกรณ์ต่างๆ ผ้ากันเปื้อนแช่น้ำยาฆ่าเชื้อกลุ่มกลูตารัลดีไฮด์ 1:200 แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดตากแห้ง เพื่อใช้ในวันถัดไป รวมทั้งให้พ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณโรงพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนล้างด้วยน้ำสะอาด

"สัยภูมิร่วมใจ ป้องกันภัยจากโรคระบาดในสุกร"

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 044-812334 ต่อ 33 , 044-811928 pvlo_cpm@dld.go.th

ข้อแนะนำร้านขายเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์/รถเร่

เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ASF

1. รับเนื้อสุกร หรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ มีการรับรองแหล่งที่มา
2. มีการพ่นทำลายเชื้อโรคยานพาหนะขนส่งเป็นประจำ
3. ไม่รับเนื้อสุกรที่ป่วยมาขาย
4. หลังการจำหน่ายเนื้อสัตว์ นำอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มีด เขียง ผ้ากันเปื้อน แช่น้ำยาฆ่าเชื้อกลุ่มกลูตารัลดีไฮด์ 1:200 แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ตากให้แห้ง เพื่อใช้ในวันถัดไป รวมทั้งพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโต๊ะ ตู้แช่ ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนล้างด้วยน้ำสะอาด

"ชัยภูมิร่วมใจ ป้องกันภัยจากโรคระบาดในสุกร"

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ 044-812334 ต่อ 13 , 044-811928 pvlo_cpm@dld.go.th